

**OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PODANIE  
TABLETEK JODU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH**

Imię i nazwisko dziecka .....

Data urodzenia (wiek) .....

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna.....

Stosowne zaznaczyć krzyżykiem

TAK, zgodnie z załączonym arkuszem informacyjnym dla rodziców i opiekunów wyrażam zgodę na podanie mojemu dziecku tabletek jodku potasu i potwierdzam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania do przyjmowania tabletek jodku potasu przez moje dziecko.

NIE, nie wyrażam zgody.

.....  
Data

.....  
podpis rodzica lub opiekuna

**Informacje dla rodziców i opiekunów**

Jodek potasu stosowany jest w przypadku katastrof nuklearnych lub uszkodzeń reaktorów jądrowych w celu zapobiegania wychytowi radioaktywnego jodu przez tarczycę. W trakcie uszkodzeń reaktorów jądrowych może dojść do emisji radioaktywnego jodu. W przypadku skażenia, radioaktywny jod wychwytywany jest przez tarczycę. Przyjęcie nieradioaktywnego jodu (np. w postaci jodku potasu) zapobiega wychytowi jodu radioaktywnego przez tarczycę przed lub po wystąpieniu skażenia.

JODEK POTASU ZOSTANIE PODANY JEDYNIEM W PRZYPADKU ZAGROŻENIA PO OGŁOSZENIU AKCJI JODOWEJ PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Sposób dawkowania:

Grupa ryzyka	Ilość stabilnego jodu	Liczba podawanych tabletek
Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc	12,5 mg jodu	¼ tabletki
Dzieci od miesiąca do 3 lat	25 mg jodu	½ tabletki
Dzieci od 3 do 12 lat	50 mg jodu	1 tabletki
Osoby od 12 do 60 roku życia	100 mg jodu	2 tabletki

Kobiety w ciąży i karmiące piersią (w każdym wieku)	100 mg jodu	2 tabletki
---	-------------	------------

Przeciwwskazania - kiedy nie przyjmować leku:

- ✓ jeśli masz uczulenie na jodek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- ✓ jeśli masz nadczynność tarczycy,
- ✓ jeśli masz zaburzenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z hipokomplementemią),
- ✓ jeśli masz choroby autoimmunologiczne połączone ze świądem i pęcherzami na skórze (opryszczkowate zapalenie skóry Duhringa).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- ✓ stosujesz lub stosowałeś w przeszłości leczenie chorób tarczycy,
- ✓ występuje nieleczona autonomia tarczycy,
- ✓ występuje zaburzenie czynności nerek,
- ✓ masz zaburzenia czynności nadnerczy i stosujesz leczenia z tym związane.

Pamiętaj! Przed przyjęciem leku zwróć się o poradę lekarza:

- ✓ w przypadku występowania złośliwego nowotworu tarczycy lub takiego podejrzenia,
- ✓ w przypadku zwężenia dróg oddechowych (powodującego trudności w oddychaniu).

Podanie leku preparatu ze stabilnym jodem może pogorszyć stan zdrowia jeśli:

- ✓ stosujesz lub stosowałeś w przeszłości leczenie chorób tarczycy,
- ✓ występuje nieleczona autonomia tarczycy,
- ✓ występuje zaburzenie czynności nerek,
- ✓ w przypadku zaburzenia czynności nadnerczy i leczenia z tym związanego.

**JEŚLI WYSTĄPIĄ JAKIEKOLWIEK OBJAWY NIEPOŻĄDANE ORAZ W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLIWOŚCI SKONTAKUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ !**